

| | Définition ou description | % de la pop. | Causes | Inné / Acquis | Symptômes | Traitements/ Médicaments |
|---|--|--------------|---|----------------------------|--|--|
| Trouble obsessionnel compulsif (TOC) | -désordres caractérisés par une obsession qui pousse la personne à adopter un comportement compulsif (répétitif) | 1 à 2 % | -40% moins de protéine spécifique qui aide la sérotonine à voyager d'une cellule nerveuse à une autre -dommage au cerveau causé par une infection auto-immune -blessure à la tête -empoisonnement au monoxyde de carbone -peut être héréditaire | A I | -parlyantes -calculer -taper -toucher -cligner des yeux -obsession -compulsion | -médicaments (6 à 10 semaines) -thérapie comportementale -psychothérapie |

| | Définition ou description | % de la pop. | Causes | Inné / Acquis | Symptômes | Traitements/ Médicaments |
|---|---|--|---|---------------|--|---|
| <p>Désordres psychotiques : désordre psychologique où les personnes perdent souvent le contact avec la réalité et ont besoin de soins pour parvenir à vivre une vie normale. Elles peuvent vivre des délires et des hallucinations.</p> | | | | | | |
| Psychose maniacodépressive | <ul style="list-style-type: none"> -atteint de moments dépressifs et maniaques -maniaques : excitation de l'humeur, l'hyperactivité -dépressif : tristesse | <ul style="list-style-type: none"> -1% -70% de vrais jumeaux -touche plus de femmes | <ul style="list-style-type: none"> -début avant 30 ans -hérédité | I | <ul style="list-style-type: none"> -insomnie -évolution sévère -progressif -excitation évidente -tenue voyante -vie en désordre -plaisante (trop) -soif, faim | <ul style="list-style-type: none"> -lithium -hospitalisation -chimiothérapie |
| Schizophrénie | -modification du fonctionnement du cerveau mais pas l'intelligence | <ul style="list-style-type: none"> -1 à 2% -5% oncle/tante -10% parent ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> -jeunes adultes -vulnérabilité biologique -stress -héréditaire -40% de deux parents schizophréniques -50% pour des jumeaux identiques | I | <ul style="list-style-type: none"> -qui cause un handicap -hallucinations -délire -perturbation de la logique de la pensée -manque d'intérêt, d'expression, monotone -perte de plaisir | <ul style="list-style-type: none"> -médicament antipsychotique -réadaptation -traitement/thérapie -réhabilitation |
| Dédoublement de la personnalité | <ul style="list-style-type: none"> -caractérisé par 2 ou plus identités ou personnalités qui alternent et qui contrôlent le comportement d'une personne -parfois une personnalité connaît et interagit avec une autre | -3 à 4 % | <ul style="list-style-type: none"> -stress -manque d'affection et de compassion pendant l'enfance -mauvaises expériences ou manque de protection contre ces expériences -commence à l'enfance si l'enfant est surchargé ou a été abusé -perte d'un parent -maladie sérieuse (hospitalisé souvent) | A | <ul style="list-style-type: none"> -perte de mémoire -perte de temps -peut être sérieux et chronique -handicap -dépression -anxiété -phobies -difficultés sexuelles -trouble d'alimentation | <ul style="list-style-type: none"> -médicaments aident à gérer quelques symptômes mais pas la maladie -psychothérapie (peut être douloureuse) -hospitalisation -hypnose |

| | Définition ou description | % de la pop. | Causes | Inné / Acquis | Symptômes | Traitements/ Médicaments |
|--|---|---------------------------------|---|---------------|---|--|
| Trouble de personnalité asociale (TPA) sociopathe | -sont rares -peut poser de graves dangers pour les autres -tueurs de série sont présumés être atteints de TPA -incapacité de ressentir l'empathie ou de la culpabilité | 8 x plus d'hommes que de femmes | -un modèle omniprésent et permanent de transgression des règles et de violation des droits d'autrui avant l'âge de 15 ans | A | -emprunte l'argent -menteurs pathologiques -criminels -meurtriers -impulsifs -extravagants -blâme les autres -sont victimes -personnalités -agressif | -thérapie comportementale et cognitive de groupe et individuelle |